


商品名	日本薬局方 ナカジマ ヨクイニン末													
内容量	500g													
製品形態	紙箱													
商品分類	一般用第3類医薬品													
ケース入数	40入													
JANコード	4936246100753													
原産国	ラオス													
使用期限	3年													
添付文書	箱裏面に記載													
製品サイズ(mm)	縦	148	横	102	奥行	65	総重量(g)	559						
使用上の注意	<p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <table border="1" data-bbox="534 1276 1324 1411"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤・かゆみ</td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td>胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状を持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 1ヶ月以上服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <p style="text-align: center;">服用の際は、用法・用量を守って下さい</p>								関係部位	症 状	皮膚	発疹・発赤・かゆみ	消化器	胃部不快感
関係部位	症 状													
皮膚	発疹・発赤・かゆみ													
消化器	胃部不快感													
効能又は効果	いぼ、皮膚のあれ													
用法及び用量	大人(15歳以上)は1回量2gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。添付のさじ1杯は1gです。													
保管及び取扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 小児の手の届かない所に保管して下さい。 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでご注意下さい。 ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。 													
お問い合わせ先	日本ヘルス株式会社 〒586-0051 大阪府河内長野市末広町2-38 TEL 0721-62-7200 FX0721-62-7201 Mail info@health-medicin.com													

2019年7月吉日

お得意先様 各位



〒586-0051
大阪府河内長野市末広町2-38
TEL:0721-62-7200 FAX:0721-62-7201
E-mail :info@health-medicin.com

一般用第3類医薬品 中嶋ヨクイニン末個包装変更のご案内

拝啓 貴社益々のご清栄の事とお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社取扱い「一般用第3類医薬品 ナカジマ ヨクイニン末 500g」の
個包装記載項目の表示位置が変更となりますのでご案内させていただきます。

尚、出荷時期に関しましては旧製品の在庫が無くなり次第となります。

お手数をお掛け致しますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

敬具

(記)

■ 該当製品

	JANコード	名称	包装	分類
1	4936246100753	日本薬局方 ナカジマ ヨクイニン末	500g	一般用医薬品 第3類

※ 仕切価格・使用期限・JANコードの変更はございません

※ 別紙にて変更箇所を記載

ご不明な点がございましたら日本ヘルス株式会社迄お問合せ下さい

以上

別紙


上面 変更後	前面 変更前
	

底面 変更後	底面 変更前
	


前面 変更後	前面 変更前
	

※ Lot 番号左側面に記載
 ※ 使用期限左側面に記載
 ※ JAN コード右側面に記載
 ※ 副作用救済制度右側面に記載

背面 変更後



背面 変更前



※ 保管及び取扱い上の注意右側面に記載

拡大図

日本薬局方 ヨクイニン末
ナカジマ ヨクイニン末
 使用上の注意 第3類医薬品
相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服用の際は、用法・用量を守って下さい
効能又は効果
 いぼ、皮膚のあれ
用法及び用量
 大人(15歳以上)は1回量2gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。添付のさじ1杯は1gです。

拡大図

日本薬局方 ヨクイニン末
ナカジマ ヨクイニン末
 使用上の注意 第3類医薬品
相談すること


- 医師の治療を受けている人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 1ヵ月以上服用しても症状がよくなる場合
は、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

服用の際は、用法・用量を守って下さい
効能又は効果
 いぼ、皮膚のあれ
用法及び用量
 大人(15歳以上)は1回量2gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。添付のさじ1杯は1gです。
保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
- 本品には防虫、防カビのために、脱酸素剤を封入していますので、ご注意下さい。
- ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町29番地の2
 製造販売元 中嶋生薬株式会社 **B229**
 TEL. 075-231-2633
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



右側面 変更後




右側面 変更前



拡大図



左側面 変更後



左側面 変更前

